

Nematrix® | LÍQUIDO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO	
Esporas de <i>Bacillus sp.</i> (1.0X10 ⁸ de UFC/mL)	40.00
Conidios de <i>Trichoderma spp.</i> (1.0X10 ³ de UFC/mL)	10.00
Conidios de <i>Paecilomyces spp.</i> (1.0X10 ³ de UFC/mL)	30.00
<i>Extracto de Tagetes erecta</i>	5.00
INGREDIENTES INERTES	
Diluyentes y acondicionadores orgánicos	15.00
.TOTAL	100.00

OMRI.anm-18820

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN, PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL,
 PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA.

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

Agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de NEMATRIX® y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar el nematocida perfectamente en el recipiente, posteriormente agregue al tanque de aplicación.

Nematrix® es un líquido emulsionable, útil para el control de las plagas aquí indicadas:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Cafeto (0)	Nematodo Agallador (<i>Meloidogyne incógnita</i>) Nematodo de la lesión (<i>Pratylenchus sp.</i>) Nematodo de la raíz de escobilla (<i>Dorylaimus sp.</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 3 aplicaciones a la base de la planta, a intervalos de 14 días; depositando 50 mL /planta; volumen de aplicación 1000 L de agua/ha.

(0): Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Una vez que la aspersion se ha secado.